

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

せき・たんに **カネドリ**® 顆粒 第②類医薬品

作用と特長

- せきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩は中枢神経に、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩は気管支に作用してせきをしずめます。またクロルフェニラミンマレイン酸塩はアレルギー性のせきに効果があります。
- たんをとり去ります。
リゾチーム塩酸塩は卵白より抽出・精製した消炎酵素物質で、のどに作用してたんをとり去ります。
さらに漢方処方によく用いられるキキョウエキスを配合しています。
- 服用しやすい顆粒剤です。
口の中で溶けやすく、水なしでも服用できます。

△使用上のご注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。
(1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがある)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 過量服用・長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

| 年齢区分 | 15才以上 | 11～14才 | 8～10才 | 5～7才 |
|------|---|---|---|---|
| 1回量 |  |  |  |  |
| | 1包 | 2/3包 | 1/2包 | 1/3包 |

上記1回量を1日3回食後に服用して下さい。

- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 5才未満のお子さまには服用させないで下さい。

成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1g

| 成分 | 分量 | 作用 |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| リゾチーム塩酸塩 | 60mg(力価) | 卵白より抽出した消炎酵素物質で、炎症を抑え、たんの咯出を容易にします |
| キキョウエキス | 125mg (原生薬500mgに相当する) | キキョウの根より抽出したエキスで、漢方処方によく用いられます |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg | 中枢神経に作用してせきをしずめます |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | せき、たんにも効果があります |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | アレルギー性のせきに効果があります |

添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、無水ケイ酸、サッカリンNa水和物、香料を含む。

保管・取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 配置期限(又は使用期限)の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記製造販売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841

TEL 0766-54-1007

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)